


Procedimiento de implante de Deflux

(Deflux implant procedure)

¿Qué es un procedimiento de implante de Deflux?


Un procedimiento de implante de Deflux es una forma de corregir el reflujo vesicoureteral (VUR). El VUR ocurre cuando la orina retrocede y vuelve a subir a los riñones.

En este procedimiento, el médico de su hijo colocará un gel llamado Deflux en el espacio donde el uréter (el tubo que transporta la orina desde el riñón) se conecta a la vejiga. El gel actúa como un obstáculo para evitar que la orina regrese al riñón.



Deflux es un gel estéril que:

- Es seguro para su niño.
- Está hecho de materiales biodegradables (materiales que se descomponen) que se encuentran naturalmente en el cuerpo.
- Puede disolverse con el tiempo. El tejido corporal normal de su hijo lo reemplazará.



¿Existen riesgos?

Algunos riesgos incluyen:

- Sangrado leve
- Infección
- Bloqueo de los uréteres
- Fracaso del tratamiento

¿Cómo debo preparar a mi hijo para el procedimiento?

Bebés

Aunque usted no puede explicarle el procedimiento a su bebé, puede ayudarlo a sentirse más seguro de la siguiente manera:

- Lleve su cobija, juguete o chupete favoritos.
- Tranquilice a su bebé su presencia y su voz.
- Lleve un biberón con jugo o fórmula para dárselo **después** del procedimiento.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya de inmediato a la sala de emergencias más cercana.

Procedimiento de implante de Deflux, continuación

Niños pequeños y en edad preescolar

- Los niños pequeños retienen información por poco tiempo. El mejor momento para que hable con su hijo es justo antes del procedimiento.
- Dígale que van a ir al hospital para que el médico lo ayude a sentirse mejor.
- Use palabras sencillas y sea sincero con él.
- Dígale que lo acompañará durante el procedimiento, tanto tiempo como sea posible.
- Cuando venga al hospital, tráigale su libro, juguete o cobija favoritos.
- También puede traerle una merienda para **después** del procedimiento.

Niños en edad escolar

- Es importante que sea sincero con su hijo en edad escolar. Suelen pensar que lo que ocurrirá será mucho peor de lo que en realidad es.
- Uno o dos días antes del procedimiento, dígale a su hijo que va a ir al hospital para que el médico pueda tratar de ayudarlo a sentirse mejor.
- Use palabras sencillas y sea sincero con su hijo. Explíquele exactamente lo que va a ocurrir.
- Dígale que lo acompañará la mayor cantidad de tiempo posible durante el procedimiento.
- Llévele su libro, juguete o juego favoritos.
- Le puede traer una merienda para **después** del procedimiento.

¿Cómo será el procedimiento?

En la mayoría de los casos el procedimiento toma menos de 30 minutos.

- Su hijo recibirá anestesia general (un medicamento que lo hará quedarse dormido).
- El médico de su hijo le colocará un tubo delgado con una cámara (cistoscopia) en la uretra que es por donde sale la orina.
- El médico de su hijo moverá el cistoscopio hacia la vejiga de su hijo para colocar el Deflux.

¿Qué pasa después del procedimiento?

La uretra de su hijo podrá estar irritada las siguientes 24-48 horas y causar los siguientes síntomas:

- A su hijo le cuesta orinar (hacer pis)
- Orina con frecuencia
- Siente ardor o dolor al orinar
- La orina tiene un tinte rosado
- No puede retener la orina
- Se orina en la cama durante unos días

¿Cómo debo cuidar a mi hijo después del procedimiento?

- Después del procedimiento, su hijo podrá sentirse un poco confundido y mareado por la anestesia.
 - Esto debería desaparecer enseguida.
 - Su hijo debe descansar ese día.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya de inmediato a la sala de emergencias más cercana.

Procedimiento de implante de Deflux, continuación

- Su hijo podrá reanudar sus actividades normales el día después.
- Dele de beber mucho líquido para que orine más.
- Si tiene dolor, puede remojarse en una tina de agua (sin jabón ni burbujas). Dígale que orine mientras esté sentado en el agua.

¿Cuándo debo llamar al médico?

Llame al médico si tiene los siguientes síntomas:

- No orina 8-10 horas
- Todavía siente dolor al orinar después de 48 horas
- Se niega a orinar
- Tiene dolor de espalda
- Vomita más de 2 veces al día
- Tiene una fiebre mayor de 101.5° F.

Llame también al médico de su hijo si tiene preguntas o le preocupa su aspecto o cómo se siente.

Esta hoja informativa contiene solo información general. Hable con el médico de su hijo o con uno de los integrantes de su equipo de atención médica sobre los cuidados específicos para él.