Baños con Hibiclens
(Hibiclens bath)

¿Qué es el baño con Hibiclens?

Para los baños con Hibiclens usamos un jabón llamado gluconato de clorhexidina (CHG, en inglés). El gluconato de clorhexidina es un limpiador especial para la piel. Este ayudar a disminuir los microbios de la piel que pueden causar infección.

No debe usarse el jabón de gluconato de clorhexidina si su hijo:

- Es alérgico al gluconato de clorhexidina.
- Tiene problemas de piel, como quemaduras, sarpullido, eczema, heridas abiertas o llagas.
- Es menor de 2 meses de edad.
- Tiene un vendaje que no se puede quitar.

¿Por qué mi hijo necesita usar jabón de gluconato de clorhexidina?

El CHG elimina más gérmenes de la piel que el agua y el jabón. Esto significa que hay menos posibilidades de infección durante y después de la cirugía.

¿Cómo debo usar el jabón de gluconato de clorhexidina?

El jabón de gluconato de clorhexidina está disponible en presentación líquida y se puede comprar en las farmacias o tiendas donde venden medicamentos. El nombre más común es Hibiclens. Sólo deberá comprar un envase pequeño que contiene aproximadamente entre 4 y 6 onzas.

Deberá usar el jabón de gluconato de clorhexidina para lavarle la piel a su hijo la noche antes de ir al hospital. Esto ayuda a prevenir infecciones y prepara la piel para la cirugía. Siga los siguientes pasos:

- Lávele el cabello con champú normal. Luego, enjuáguele el cabello y el cuerpo para eliminar todo el residuo de champú.
- Lávele la cara con agua y jabón común.
- Lávele las partes íntimas (los genitales) con agua y jabón normal.
- Enjuague el cuerpo de su hijo en la ducha. Use agua tibia y enjuague desde el cuello hacia abajo.
- Moje una toallita limpia. Cierre la llave del agua.
- Ponga un poco de jabón de gluconato de clorhexidina en la toallita. Use solo la cantidad necesaria para cubrir la piel.
- Lávele con suavidad todo el cuerpo por 5 minutos. Ponga especial atención en el área donde se realizará la cirugía o el procedimiento. **No use el jabón de gluconato de clorhexidina en la cara, las orejas, los ojos, la nariz, la boca ni las partes íntimas de su hijo.**
- Abra nuevamente la llave del agua y enjuáguele bien el cuerpo con agua.
- Séquele bien la piel dándole palmaditas suaves con una toalla limpia.

 ©2024 Children's Healthcare of Atlanta, Inc. All rights reserved.

¿Qué debo hacer después de usar el jabón gluconato de clorhexidina?

- No le ponga a su hijo ninguna loción, crema hidratante ni maquillaje en la piel después de la ducha o el baño. Estos productos pueden atraer microbios a la piel.
- **Asegúrese de que su hijo no se afeite el vello de ninguna parte del cuerpo antes de la cirugía. Esto también puede aumentar la posibilidad de infección.**
- Vista a su hijo con pijamas limpios recién lavados.
- Antes de acostarlo asegúrese de que la cama esté tendida con sábanas limpias recién lavadas.
- Lave todas las cosas que vaya a traer al hospital, como mantas o animales de peluche.
- No deje que su hijo se bañe o se duche por la mañana el mismo día de la cirugía.
- Un miembro del equipo de atención médica le dará a su hijo una bata de hospital limpia y un gorro de cirugía para que use el día de la cirugía.

¿Cuándo debo llamar al médico?

Llame al médico si su hijo presenta cualquiera de los siguientes problemas en la piel que no desaparecen después de enjuagar con agua tibia:

- Enrojecimiento
- Ardor
- Picazón o urticaria
- Irritación o sarpullido
- Aumento de la sensibilidad al sol

Llame al médico <u>de inmediato</u> o llame al 911 si tiene alguna inquietud urgente o si su hijo tiene lo siguiente:

- Hinchazón en la cara, labios o lengua.
- Problemas respiratorios o tos.

De todas formas, llame al médico de su hijo si tiene preguntas o le preocupa el aspecto que tiene su hijo o cómo se siente.

Esta hoja informativa contiene sólo información general. Hable con el médico de su niño o con uno de los integrantes de su equipo de atención médica sobre el cuidado específico para él.

 ©2024 Children's Healthcare of Atlanta, Inc. All rights reserved.