

Síndrome pospericardiotomía

(Post-pericardiotomy syndrome)



¿Qué es el síndrome de pospericardiotomía?

El corazón tiene una bolsa o saco que lo rodea llamada pericardio. Después de una cirugía de corazón, esta bolsa se puede inflamar y se puede acumular líquido. Esto se llama síndrome de pospericardiotomía (PPS, en inglés).

¿Por qué se produce el síndrome pospericardiotomía?

- Los niños pueden presentar el síndrome después de una operación cerca o en el corazón.
- A veces sucede cuando se toca el pericardio durante una operación.
- Este síndrome también le puede ocurrir a niños que no hayan tenido una cirugía de corazón abierto.
- No lo produce ninguna infección y no significa que haya daños en el músculo cardíaco.

¿Cuáles son los posibles síntomas?

Su hijo puede presentar uno o más de los siguientes síntomas:

- Fiebre (temperatura mayor de 100.5°F)
- Dolor de pecho
- Más cansancio de lo normal
- Más enojo o irritabilidad de lo normal
- Malestar general o dolor en el cuerpo (síntomas parecidos a los de la gripe o influenza)
- Poco apetito (come menos de lo normal)
- Dolores de estómago
- Náuseas y vómitos
- Piel pálida, grisácea o azulada

¿Qué pruebas podrían hacerle a mi hijo?

Posiblemente le hagan una radiografía de pecho y un ecocardiograma (un eco) para saber si tiene el síndrome de pospericardiotomía. Estas pruebas determinarán si hay líquido alrededor del corazón.

¿Cuál es el tratamiento convencional para este síndrome?

- El médico de su hijo le dará medicamentos para tratar el PPS y reducir el área (saco) del corazón que está inflamada.
- El médico de su hijo le dirá por cuánto tiempo debe tomarlo y conversará con usted sobre los cuidados de control.

¿Cuándo debo llamar Children's Healthcare of Atlanta Cardiology?

Llame a Children's Healthcare of Atlanta Cardiology si su hijo presenta los siguientes síntomas:

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya de inmediato a la sala de emergencias más cercana

Síndrome pospericardiotomía, continuación

- Tiene fiebre (temperatura mayor de 100.5°F)
- Está más cansado de lo normal
- Tiene dolor en el pecho
- Está más enojado o irritable de lo normal
- Tiene dolor de cuerpo y malestar general
- Cambia su nivel de actividad de repente (no se mueve ni juega como suele hacerlo)
- Cambia su apetito de repente (no tiene las mismas ganas de comer de siempre)
- Está pálido o su piel se torna gris o azulada

Llame también si tiene alguna pregunta o le preocupa el aspecto que tiene su hijo o cómo se siente.

Esta hoja informativa contiene sólo información general. Hable con el médico de su hijo o con uno de los integrantes de su equipo de atención médica sobre el cuidado específico para él.