

Regreso a la actividad física después de sufrir una conmoción cerebral

Lacrosse (niños)

Etapa	Actividad física	Ejercicios específicos de lacrosse	Objetivos
1	Reposo	Reposo con la excepción del paseo cotidiano	Promover la recuperación poco después de una lesión
2	Actividad aeróbica suave	10 a 15 minutos de caminata o de bicicleta fija	- Agregar actividad aeróbica suave - Controlar si reaparecen los síntomas
3	- Actividad aeróbica moderada - Entrenamiento de resistencia suave	- Trotar durante 20 o 30 minutos con casco y guantes - Ejercicios con pesas livianas (una serie de 10 repeticiones)	- Aumentar la actividad aeróbica - Controlar si reaparecen los síntomas
4	- Actividad de alta intensidad - Ejercicios de entrenamiento sin contacto específicos de lacrosse	- Ejercicios de agilidad y <i>sprints</i> - Mecida de la pelota en el palo (<i>cradling</i>), recepción (<i>catching</i>), recogida de la bola del suelo (<i>scooping</i>), fildeo de bolas rodadas, lanzamiento a portería (<i>shooting</i>), cambio de dirección, pase y va. - Ejercicio de cascada, ejercicio de hámster, ejercicio de rueda de molino, ejercicio de ojo de águila Comenzar con casco y guantes, avanzar hasta usar el equipo de protección completo si desaparecen los síntomas	- Maximizar la actividad aeróbica - Acelerar a toda velocidad con cambio de dirección (cortes) - Iniciar movimientos de rotación de cabeza - Controlar si reaparecen los síntomas
5	- Actividad de alta intensidad - Ejercicios de entrenamiento de lacrosse con contacto limitado	- Ejercicios de agilidad, <i>sprints</i> y entrenamiento normal con pesas - Táctica de <i>riding</i> después de tirar, táctica de <i>riding</i> desde la línea meta, recoger y rodar (<i>pick and roll</i>), práctica 1 contra 1 - No puede participar de juegos de práctica (<i>scrimmages</i>) Equipo de protección completo	- Maximizar la actividad aeróbica - Agregar entrenamiento de fuerza de alta intensidad - Agregar desaceleración/fuerzas de rotación en un entorno controlado - Controlar si reaparecen los síntomas
6	Práctica completa (solo con autorización médica)	- Actividades de entrenamiento normales - Juegos de práctica normales	- Evaluar con frecuencia durante la práctica - Controlar si reaparecen los síntomas
7	Regreso al juego	Juego normal en partidos	Volver al juego normal en partidos

Otras recomendaciones:

Si es posible, un entrenador deportivo escolar o un adulto responsable debe supervisar al alumno a medida que avanza en cada etapa.

Indicaciones para el alumno:

- Podrá iniciar la Etapa 2 cuando los síntomas hayan disminuido notablemente y pueda tolerar asistir a la escuela medio tiempo.
- Podrá iniciar la Etapa 3 cuando tolere asistir a la escuela tiempo completo SIN tener síntomas de conmoción.
- Podrá avanzar a la etapa siguiente pasadas 24 horas siempre y cuando los síntomas no regresen DURANTE o DESPUÉS del entrenamiento.
- NO podrá pasar a la Etapa 6 sin autorización por escrito de un proveedor de atención médica.
- Deberá volver a consultar al médico si tienen dificultad para pasar por estas etapas sin presentar síntomas.

 choa.org/concussion

 404-785-KIDS (5437)

La información de este documento es de carácter general y no debe considerarse como una recomendación médica específica. Consulte a un médico u otro proveedor de atención médica siempre que tenga preguntas o inquietudes sobre la salud de su hijo.

En caso de una inquietud urgente o emergencia, llame al 911 o vaya de inmediato al Servicio de Urgencias (ED) más cercano.



Children's
Healthcare of Atlanta