

Regreso a la actividad física después de sufrir una conmoción cerebral

Béisbol/sóftbol

Etapa	Actividad física	Ejercicios específicos de béisbol/sóftbol	Objetivos
1	Reposo	Reposo con la excepción del paseo cotidiano	Promover la recuperación poco después de una lesión
2	Actividad aeróbica suave	10 a 15 minutos de caminata o de bicicleta fija	- Agregar actividad aeróbica suave - Controlar si reaparecen los síntomas
3	- Actividad aeróbica moderada - Entrenamiento de resistencia suave	- Trotar durante 20 o 30 minutos - Entrenamiento con pesas livianas (una serie de 10 repeticiones)	- Aumentar la actividad aeróbica - Controlar si reaparecen los síntomas
4	- Actividad de alta intensidad - Ejercicios de entrenamiento sin contacto específicos de béisbol/sóftbol	- Ejercicios de agilidad y <i>sprints</i> - Programa de lanzamiento con intervalos, Lanzamientos en el <i>bullpen</i>, fildeo de rodados (<i>rollings</i>), doble matanza, recepción de elevados (<i>flies</i>), intentos de <i>pick-off</i> - Carrera entre bases, práctica de abandono de posición en cuclillas del <i>catcher</i> y <i>dry cuts</i> - Práctica de bateo con el <i>tee</i>	- Maximizar la actividad aeróbica - Acelerar a toda velocidad con cambio de dirección (cortes) - Iniciar movimientos de rotación de cabeza - Controlar si hay síntomas
5	- Actividad de alta intensidad - Ejercicios de entrenamiento de béisbol/softbol con contacto limitado	- Ejercicios de agilidad, <i>sprints</i> y entrenamiento con pesas convencional - Bateo con máquina lanzapelotas y transición a práctica de bateo en vivo	- Maximizar la actividad aeróbica - Agregar entrenamiento de fuerza de alta intensidad - Agregar desaceleración/fuerzas de rotación en un entorno controlado - Controlar de síntomas
6	Práctica completa (solo con autorización médica)	- Actividades de entrenamiento normales - Juegos de prácticas (<i>scrimmages</i>) normales	- Evaluar con frecuencia durante la práctica - Controlar si reaparecen los síntomas
7	Regreso al juego	Juego normal en partidos	Volver a juego normal en partidos

Otras recomendaciones:

Si es posible, un entrenador deportivo escolar o un adulto responsable debe supervisar al alumno a medida que avanza en cada etapa.

Indicaciones para el alumno:

- Deberá usar siempre un casco de bateo cuando esté cerca del área de bateo.
- Podrá iniciar la Etapa 2 cuando los síntomas hayan disminuido notablemente y pueda tolerar asistir a la escuela medio tiempo.
- Podrá iniciar la Etapa 3 cuando tolere asistir a la escuela tiempo completo SIN tener síntomas de conmoción.
- Podrá avanzar a la etapa siguiente pasadas 24 horas siempre y cuando los síntomas no regresen DURANTE o DESPUÉS del entrenamiento.
- NO podrá pasar a la Etapa 6 sin autorización por escrito de un proveedor de atención médica.
- Se recomienda volver a consultar al médico si no logra pasar a la siguiente etapa después de tres intentos.

 choa.org/concussion

 404-785-KIDS (5437)

La información de este documento es de carácter general y no debe considerarse como una recomendación médica específica. Consulte a un médico u otro proveedor de atención médica siempre que tenga preguntas o inquietudes sobre la salud de su hijo.

En caso de una inquietud urgente o emergencia, llame al 911 o vaya de inmediato al Servicio de Urgencias (ED) más cercano.



Children's
Healthcare of Atlanta