Circuncisión
(Circumcision)

¿Qué es la circuncisión?

La circuncisión es una operación que se realiza para extirpar el prepucio del pene.

¿Cómo debo cuidar a mi hijo después de la operación?

Siga las siguientes indicaciones:

Limpieza y cuidado de la zona

- Deje el vendaje puesto por el tiempo que indique el médico. Puede quitar con mucho cuidado el vendaje con el primer o segundo baño de su hijo si no se ha salido.
- Coloque un ungüento antibiótico sencillo como Neosporin en la punta del pene 2 días después de la operación o si el vendaje se sale antes de ese tiempo. Esto ayuda a prevenir infecciones y hace que no se pegue al pañal.
- Después de la operación, no bañe a su hijo por 2 días a menos que el médico lo autorice.
  - Hasta que eso ocurra dele baños de esponja.
  - Limpie el pene cuidadosamente con agua tibia todos los días.
  - Si se ensucia la zona con las heces, límpielo lo mejor que pueda. Puede usar toallitas desechables para bebé.
  - Después de 2 días puede bañarlo en la tina o darle una ducha.
  - No le dé baños largos ni deje que nade por 10 días después de la operación.
- A partir del primer baño, coloque un ungüento antibiótico como Neosporin sobre todo el pene.
  - Haga esto por 1 semana, cada vez que le cambie el pañal.
  - Haga esto 3 veces al día durante una semana si su hijo ya no usa pañales.

Administración de medicamentos

- El médico podrá recetarle un analgésico para aliviar las molestias cuando esté en casa. Déselo exactamente como le indicó el médico y solo en caso necesario para aliviar el dolor intenso.
- Si el paracetamol (Tylenol u otra marca propia menos costosa) o el ibuprofeno (Motrin, Advil o una marca menos costosa) alivia el dolor, déselo en lugar del medicamento recetado. Siga con detenimiento las instrucciones del envase o pregunte al médico qué cantidad de medicamento debe darle.

  LO QUE NO DEBE HACER:
  - No le dé a su hijo más de 5 dosis de paracetamol en 24 horas.
  - No dé paracetamol (*acetaminophen*, en inglés) a bebés menores de 3 meses sin antes consultar al médico.
  - No dé ibuprofeno (*ibuprofen*, en inglés) a bebés menores de 6 meses sin antes consultar al médico.
  - No le dé el paracetamol junto con el medicamento para el dolor que le recetaron.

- El médico le informará si su hijo necesita otros medicamentos.

Si tiene alguna preocupación urgente o una emergencia, llame al 911 o vaya de inmediato a la sala de urgencias más cercana.

 ©2024 Children's Healthcare of Atlanta, Inc. All rights reserved.

Circuncisión, continuación

¿Qué más necesito saber?

- Es normal que tenga un poco de secreción en el área. **Llame de inmediato al médico de su hijo si observa coágulos de sangre grandes o tiene una hemorragia que no se detiene incluso después de hacer presión en el área**.
- Podrá también tener una costra gelatinosa amarillenta. Esto es parte de la cicatrización normal y suele desaparecer después de 1 semana.
- No se alarme si nota inflamación alrededor del pene; puede demorarse entre 3 y 4 semanas en desaparecer. Llame al médico si cree que la hinchazón es demasiado grave.
- Su hijo debe hacer actividades tranquilas como leer, colorear o ver televisión por 1 semana. No lo deje correr, brincar, trepar ni montarse en juguetes a horcajadas (a caballo). Cuídelo para prevenir cualquier lesión en el pene.
- Puede seguir su dieta habitual. Al principio dele poca cantidad. La anestesia puede causar náuseas y vómitos las primeras horas después de la operación. **Llame al médico si su hijo no tolera los líquidos por más de 8 horas.**

¿Cuándo debo llamar al médico?

Llame al médico **de inmediato** si observa lo siguiente:

- Enrojecimiento que se extiende hacia la base del pene, hacia el escroto o el abdomen (pancita).
- Coágulos de sangre grandes o hemorragia que no se detiene incluso después de hacer presión en el área.
- Capa o costra amarillenta que no mejora en 1 semana.
- Dolor que no se alivia con el analgésico.
- Fiebre de más de 101.5°F, sin otros signos de enfermedad.
- Problemas para tolerar líquidos por más de 8 horas.

Llame también si tiene alguna pregunta o le preocupa la apariencia de su hijo o cómo se siente.

Esta hoja informativa contiene sólo información general. Hable con el médico o con uno de los integrantes del equipo de atención médica sobre el cuidado específico de su hijo.

Si tiene alguna preocupación urgente o una emergencia, llame al 911 o vaya de inmediato a la sala de urgencias más cercana.

 ©2024 Children's Healthcare of Atlanta, Inc. All rights reserved.