


Cómo disolver el medicamento en una jeringa

(How to dissolve medicine in a syringe)

Instrucciones:

Paso 1

- Retire el émbolo de la jeringa oral.
- Coloque la(s) tableta(s) en la jeringa.
- Vuelva a colocar el émbolo en la jeringa, empujando hasta donde sea posible.



Paso 2

- Agregue agua de la llave a temperatura ambiente (que no esté fría, tibia o caliente) al vaso dosificador del medicamento.



Paso 3

- Usando la jeringa que contiene la(s) tableta(s), extraiga 2 a 3 mL (mililitros) de agua y colóquelos en la jeringa.



En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya de inmediato a la sala de emergencias más cercana.

Cómo disolver el medicamento en una jeringa, continuación

Paso 4

- Coloque la tapa de la jeringa.
- Agite suavemente la jeringa para disolver la(s) tableta(s).



**Tapa de la
jeringa**

Paso 5

- Las tabletas pueden tardar unos cuantos minutos en disolverse totalmente.
- Las tabletas se disuelven más rápido cuando se agita la jeringa.

Paso 6

- Dele a su hijo su dosis del medicamento tal como lo indicó el médico.

Paso 7

- Limpie los suministros:
 - Retire el émbolo de la jeringa.
 - Limpie con cuidado el émbolo, la jeringa, la tapa de la jeringa y el vaso dosificador del medicamento usando agua tibia jabonosa. No coloque los suministros en el lavaplatos ya que se pueden borrar las marcas.
 - Enjuáguelos bien y póngalos a secar al aire.
- Puede reutilizar la jeringa limpia y su tapa siempre y cuando el émbolo se desplace con facilidad.
- Puede reutilizar el vaso de dosificador limpio.

Esta hoja informativa contiene solo información general. Hable con el médico de su niño o con uno de los integrantes de su equipo de atención médica sobre el cuidado específico para él.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya de inmediato a la sala de emergencias más cercana.