

Nayzilam

(midazolam intranasal recargado)

[Nayzilam (prefilled intranasal midazolam)]



¿Qué es el Nayzilam (midazolam intranasal precargado)?

Nayzilam (midazolam intranasal precargado) es un medicamento de emergencia para detener las convulsiones también llamado medicamento de rescate para convulsiones. Nayzilam es solo para niños mayores de 12 años.

¿Cuándo lo necesita mi hijo?

Use este medicamento solo cuando el médico de su hijo lo indique. Su hijo podrá necesitarlo en los siguientes casos:

- Tiene convulsiones que duran más de 5 minutos.
- Tiene convulsiones en serie (3 convulsiones seguidas o más en 1 hora).


NO debe usarse como un medicamento de mantenimiento para prevenir las convulsiones.

¿Qué dosis necesita mi hijo?

- Cada dispositivo contiene 1 dosis con 5 mg (miligramos).
- A veces, 1 dosis no es suficiente. **Dele una segunda dosis solo si el médico lo indica.**

¿Cómo se prepara y administra una dosis?

1. Si su hijo tiene una convulsión, acuéstelo de costado en el piso con mucho cuidado. Corra cualquier objeto o mueble que pueda hacerle daño.
2. Saque del envase el dispositivo con el medicamento del envase.



3. Sostenga el medicamento de la siguiente forma:
 - Coloque el dedo pulgar en la parte inferior del émbolo.
 - Coloque el dedo índice y medio a ambos lados del aplicador.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.

Nayzilam (midazolam intranasal recargado), continuación

No rocíe (cebe) este medicamento antes de administrarlo. Si lo hace, se quedará sin medicamento para administrar.

- Coloque la punta del aplicador en 1 fosa nasal hasta que el dedo que sostiene el dispositivo quede apoyado junto a la parte inferior de la nariz de su hijo.



- Presione con firmeza el émbolo con el dedo pulgar. Ya le administró la dosis. Luego, quite el aplicador de la fosa nasal.



- Deje a su hijo de costado en el piso. Obsérvelo con detenimiento y dele la ayuda que necesite.
- Tome nota de la hora en que le administró el medicamento.
- Deseche el dispositivo. Le administró la dosis completa.

¿Qué puedo esperar después de administrarlo?

Hable con el médico sobre los siguiente:

- Cuándo debería detenerse la convulsión o las convulsiones en serie (seguidas).
- Qué hacer si las convulsiones no se detienen entre 5 y 10 minutos después de administrar Nayzilam. Tal vez el médico le indique administrar una segunda dosis.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.

Nayzilam (midazolam intranasal recargado), continuación

Si las convulsiones se detienen después de la primera dosis:

- Mantenga a su hijo de costado y obsérvelo detenidamente.
- Solicite atención médica de inmediato.

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios?

Su hijo puede tener los siguientes efectos secundarios (1 o más):

- Somnolencia o mareos
- Dolor de cabeza
- Molestias en la nariz
- Tose o estornuda
- Sabor amargo en la boca

¿Cuándo debo llamar al 911?

Llame al 911 de inmediato si su hijo tiene lo siguiente:

- Respiración superficial o lenta o deja de respirar.
- Sueño extremo.
- Color azulado o morado en las uñas, labios o encías.
- Tiene convulsiones en serie que son distintas a otras convulsiones en serie que tuvo antes.
- Tiene convulsiones que le preocupan. Tal vez le preocupe cuán a menudo ocurren, cuán intensas son o cuánto duran.

Llame también si tiene que administrar otra dosis de Nayzilam.

¿Qué más debo saber?

- Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Asegúrese de que los medicamentos no caduquen y que el envase no se dañe.
- No quite el medicamento de su envase hasta que esté listo para administrarlo.

Esta hoja informativa contiene sólo información general. Hable con el médico de su niño o con uno de los integrantes de su equipo de atención médica sobre el cuidado específico para él.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.