

Sondaje del conducto lagrimal e irrigación

(Tear duct probing and irrigation)



¿Qué es un conducto lagrimal?

Un conducto lagrimal es un pequeño pasaje entre la esquina interior de los párpados y el interior de la nariz. Este drena lágrimas y moco.

¿Qué es un conducto lagrimal obstruido?

El conducto lagrimal se obstruye cuando el pasaje se tapa y no drena bien. La obstrucción de los conductos lagrimales se presenta comúnmente en los bebés, y en la mayoría de los casos se resuelve por sí solo. Un conducto lagrimal obstruido produce un exceso de lágrimas y mucosidad y puede provocar una infección y costras en las pestañas.

¿Qué es el sondaje del conducto lagrimal?

Un sondaje del conducto lagrimal es un tipo de cirugía. El médico introducirá una sonda delgada y flexible a través del conducto lagrimal obstruido para abrirla. La sonda no permanece en el conducto lagrimal. Después, irrigará el conducto lagrimal con solución salina para comprobar que esté abierto.

Un sondaje del conducto lagrimal es necesario en los siguientes casos:

- El conducto lagrimal obstruido no se arregla por sí solo y tiene un lagrimeo constante.
- Hay una infección grave.
- Tiene infecciones con frecuencia.

¿Cómo debo atender a mi hijo después de la cirugía?

Algunas instrucciones acerca del tratamiento:

- Los ojos y la nariz de su hijo podrán drenar una pequeña cantidad de líquido teñido de sangre por 3 días. Puede limpiar la secreción con un paño limpio.
- Su hijo debe quedarse en casa después de la operación. No lo lleve a la guardería ni a la escuela ese día. Su hijo tendrá que descansar.
- Anime a su hijo a beber mucho líquido (a menos que el médico le pida que tome menos líquido).
- Su hijo podrá reanudar sus actividades normales y su alimentación cuando se sienta bien.
- Administre los medicamentos según indicó el médico.
- La mayoría de los niños suelen tener un poco de dolor después de la operación. Si cree que su hijo está adolorido, dele paracetamol (Tylenol, Tempra, Panadol o una marca genérica más económica) si el médico lo recomienda. Siga con cuidado las instrucciones del envase o pregunte al médico de su hijo cuánto medicamento debe darle.
 - No le dé a su hijo más de 5 dosis de paracetamol en 24 horas.
 - No le dé paracetamol a un bebé menor de 3 meses a menos que el médico le indique que puede dárselo.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana

Sondaje del conducto lagrimal e irrigación, continuación

¿Cuándo debo llamar al médico?

Llame al médico **de inmediato** si su hijo tiene lo siguiente:

- Fiebre (temperatura mayor de 100.4°F o más) por más de 3 días
- Fiebre mayor de 101°F
- El párpado está hinchado o se siente caliente al tacto
- El párpado tiene pus
- Sangrado de color rojo brillante
- Secreción teñida de sangre por más de 3 días

Llame también si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el aspecto de su hijo o cómo se siente.

Esta hoja informativa contiene sólo información general. Hable con el médico de su niño o con uno de los integrantes de su equipo de atención médica sobre el cuidado específico para él.