

Valtoco (atomizador nasal de diazepam)

[Valtoco (diazepam nasal spray)]



¿Qué es el Valtoco (atomizador nasal de diazepam)?

El Valtoco (atomizador nasal de diazepam) es un medicamento de emergencia para detener las convulsiones también llamado medicamento de rescate para convulsiones.

¿Cuándo lo necesita mi hijo?

Use este medicamento solo cuando el médico de su hijo lo indique. Su hijo podrá necesitarlo en los siguientes casos:

- Tiene convulsiones que duran más de 5 minutos.
- Tiene convulsiones en serie (3 convulsiones seguidas o más en 1 hora).

NO debe usarse como un medicamento de mantenimiento para prevenir las convulsiones.

¿Qué dosis necesita mi hijo?

El médico le recetará la dosis del medicamento en miligramos (mg) que sea más adecuada para su hijo según la edad y el peso. Pida al médico o farmacéutico marque con un círculo la dosis correspondiente en la página 1 o 3 para que sepa qué instrucciones debe seguir.

- Vienen 2 dosis de medicamento en 1 sola caja.
- A veces, 1 dosis no es suficiente. Solo administre una segunda dosis si el médico lo indica.

¿Cómo se prepara y administra una dosis?

Cómo administrar las dosis de 5 mg y 10 mg


1. Si su hijo tiene una convulsión acuéstelo de costado en el piso con mucho cuidado. Corra cualquier objeto o mueble que puedan hacerle daño.
2. Solo saque 1 envase de la caja.



En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de emergencias más cercana.

Valtoco (atomizador nasal con diazepam), continuación

3. Saque el dispositivo con el medicamento del empaque.



4. Sostenga el medicamento de la siguiente forma:

- Coloque el dedo pulgar en la parte inferior del émbolo.
- Coloque el dedo índice y medio a ambos lados del aplicador.

No rocíe el medicamento antes de administrarlo. Si lo hace, ya no habrá más medicamento para administrar.

5. Coloque la punta del aplicador en una fosa nasal hasta que el dedo que sostiene el dispositivo quede apoyado contra la parte inferior de la nariz de su hijo. No todo el aplicador tiene que entrar dentro de la nariz.



6. Presione con firmeza sobre el émbolo con el dedo pulgar. Luego, quite el aplicador de la fosa nasal.



En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de emergencias más cercana.

Valtoco (atomizador nasal con diazepam), continuación

7. Deje a su hijo acostado en el piso. Obsérvelo con detenimiento y dele la ayuda que necesite.
8. Tome nota de la hora en que el administró el medicamento.
9. Deseche el dispositivo. Le administró la dosis completa.

Cómo administrar las dosis de 15 mg y 20 mg

1. Si su hijo tiene una convulsión acuéstelo de costado en el piso con mucho cuidado. Corra los objetos o muebles que puedan hacerle daño.
2. Solo saque 1 empaque de la caja.



3. Saque 1 dispositivo de medicamento del empaque. Un empaque debe tener 2 dispositivos. Esta es 1 dosis completa cuando se administran los 2 dispositivos que vienen en la caja.
4. Sostenga el medicamento de la siguiente forma:
 - Coloque el dedo pulgar en la parte inferior del émbolo.
 - Coloque el dedo índice y medio a ambos lados del aplicador.

No rocíe el medicamento antes de administrarlo. Si lo hace, ya no habrá más medicamento para administrar.

5. Inserte la punta del aplicador en una fosa nasal hasta que el dedo que sostiene el medicamento quede apoyado contra la parte inferior de la nariz de su hijo. No todo el aplicador tiene que entrar dentro de la nariz.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de emergencias más cercana.

Valtoco (atomizador nasal con diazepam), continuación



6. Presione con firmeza sobre el émbolo con el dedo pulgar. Luego, retire el aplicador de la fosa nasal.



7. **Todavía no ha** administrado la dosis completa. Use el segundo dispositivo y administre el medicamento en la otra fosa nasal. **No espere para usar el segundo dispositivo.**



8. Deje a su hijo acostado en el piso. Obsérvelo con detenimiento y dele la ayuda que necesite.
9. Anote la hora en que le administró el medicamento.
10. Deseche los dos dispositivos. Le administró la dosis completa.

¿Qué debo esperar después de administrarlo?

Hable con el médico sobre los siguiente:

- Cuándo debería detenerse la convulsión o las convulsiones en serie (seguidas).
- Qué hacer si las convulsiones no se detienen. Tal vez le indiquen administrar una segunda dosis.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de emergencias más cercana.

Valtoco (atomizador nasal con diazepam), continuación

Si las convulsiones se detienen después de la primera dosis:

- Mantenga a su hijo de costado y obsérvelo detenidamente.
- Solicite atención médica de inmediato.

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios?

Su hijo puede tener los siguientes efectos secundarios (1 o más):

- Somnolencia o mareos
- Dolor de cabeza
- Molestias en la nariz
- Sabor amargo en la boca

Valtoco puede provocar ideas suicidas en unas muy pocas personas. Llame al médico **de inmediato** si su hijo tiene:

- Cambios de comportamiento o en su estado de ánimo
- Agitación
- Insomnio (no puede conciliar el sueño ni permanecer dormido)
- Ansiedad o irritabilidad nuevas o que empeoran.

¿Cuándo debo llamar al 911?

Llame al 911 **de inmediato** si su hijo tiene lo siguiente:

- Respiración superficial o lenta o deja de respirar.
- Sueño extremo.
- Color azulado o morado en las uñas, labios o encías.
- Tiene convulsiones en serie que son distintas a otras convulsiones en serie que tuvo antes.
- Tiene convulsiones que le preocupan. Tal vez le preocupe cuán a menudo ocurren, cuán intensas son o cuánto duran.

Llame también si tiene que administrar otra dosis de Valtoco.

¿Qué más debo saber?

- Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Asegúrese de que los medicamentos no caduquen y que el envase no se dañe.
- No quite el medicamento de su envase hasta que esté listo para administrarlo.

Esta hoja informativa contiene sólo información general. Hable con el médico de su niño o con uno de los integrantes de su equipo de atención médica sobre el cuidado específico para él.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de emergencias más cercana.

Valtoco (atomizador nasal con diazepam), continuación

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de emergencias más cercana.