



Children'sSM
Healthcare of Atlanta
Dedicated to All Better

Amputaciones traumáticas


Un traumatismo es la causa de la mayoría de las amputaciones que ocurren durante la niñez. Los niños que sufren amputaciones necesitan ser atendidos por especialistas pediátricos. El Programa de deficiencia de extremidades (Limb Deficiency Program) sabe que las necesidades de los niños son diferentes a las de los adultos.

Nuestro equipo ha recibido capacitación especial para tratar lo siguiente:

Placas de crecimiento

Estas son zonas localizadas en los extremos de los huesos de su niño, en donde crece nuevo hueso.

- Cuando su niño deja de crecer, las placas de crecimiento se cierran y son reemplazadas por hueso sólido.
- El médico de su niño tratará de salvar las placas de crecimiento para que la extremidad de su niño continúe creciendo.



Cicatrización de la piel

La piel de su niño es más elástica y tiene mejor irrigación que la de un adulto. Esto le ayudará a cicatrizar más rápidamente.

Crecimiento excesivo de hueso

Alrededor de la extremidad amputada puede crecer una gran cantidad de hueso.

- Esto ocurre durante el crecimiento normal del niño.
- Es un problema frecuente en niños con amputaciones.
- Puede suceder en cualquier momento, mientras su niño esté aún creciendo.
- Puede producir dolor y enrojecimiento.
- Este exceso de hueso también puede producir problemas mientras su niño usa la prótesis (extremidad artificial).

El cirujano de su niño tratará de evitar que esto suceda.




Revisión de la desarticulación de rodilla

- Su niño podría necesitar otro tipo de cirugía si el traumatismo es tan grave que el cirujano no tiene otra opción.

Esta cirugía se conoce como desarticulación.

- Esta amputación se hace a través de la articulación en vez de hacerse por el hueso.



Esto significa que:

- No se afecta la placa de crecimiento.
- No hay crecimiento excesivo de hueso.
- El extremo de la extremidad se puede utilizar para apoyar el peso de su niño.

Apoyo

Una amputación puede ser algo muy difícil para su niño y para usted.

- Nuestro equipo responderá sus preguntas.
- El cirujano de su niño le ayudará a tomar la mejor decisión.
- Los especialistas en vida infantil y los trabajadores sociales les ayudarán a usted y a su niño a enfrentar esa decisión antes y después de la cirugía.

Lo que usted y su niño sentirán

Su niño necesitará tiempo para acostumbrarse a la pérdida de una extremidad.

- Es lógico que él se sienta enojado y triste por la pérdida de la extremidad.
- También podría tener problemas de autoestima.

Su manera de reaccionar puede ayudarle a su niño.

- Sea positivo.
- Participe activamente motivándolo y apoyándolo.

Con frecuencia los padres se sienten como si hubieran hecho algo malo. Si desean ayuda, pueden obtener consejería familiar por intermedio de Children's.



 Visite choa.org/limbdeficiency para más información sobre el Programa de deficiencia de extremidades (*Limb Deficiency Program*) de Children's.